

Lavande (PSN)

Lavandula angustifolia 15 ml

dōTERRA® | CANADA

PAGE D'INFORMATION DU PRODUIT



CPTG Certified Pure Tested Grade®

Application: A T I N

Partie de la plante : Herb top floraison

Méthode de collecte : Distillation à la vapeur

Description aromatique : Chaud, épicé, terreux, doux

Principaux constituants : Linalool, acétate de linalyle

Lavande (PSN)

Lavandula angustifolia 15 ml

Référence : 30112113

Prix de gros : \$29.50 CAD

Prix public : \$39.33 CAD

PV: 24.50



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le parfum léger et floral de l'huile essentielle de Lavande peut produire des avantages apaisants, reposants et relaxants pour l'utilisateur. Dans cette perspective, l'huile essentielle de Lavande possède une variété illimitée d'applications. NPN# 80061038

UTILISATIONS

Thérapeutique

- Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les maux de tête.
- Utilisé en aromathérapie comme un sédatif et calmant.
- Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la toux.
- Utilisé en aromathérapie pour comme un carminatif et antispasmodique pour soulager les symptômes des troubles gastro-intestinaux.
- Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les douleurs articulaires et musculaires liées à une entorse, déchirure musculaire et la polyarthrite rhumatoïde.

INSTRUCTIONS

Usage aromatique : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de votre choix.

Usage interne : Diluez une goutte dans 120 mL de liquide.

Usage topique : Diluez une goutte dans 5-10 gouttes d'huile porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau.

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de portée des enfants. Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux et les membranes muqueuses ; en cas de contact, rincer soigneusement avec de l'huile végétale. En cas d'ingestion accidentelle, obtenez des soins médicaux d'urgence ou contactez un Centre de contrôle anti-poison. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si vous souffrez d'épilepsie ou faites de l'asthme ou si vos symptômes persistent ou s'aggravent. Si vous êtes enceinte ou en cours d'allaitement, n'utilisez pas ce produit. Éviter l'exposition au soleil de la zone où le produit a été appliqué. Ne pas exposer les zones où le produit a été appliqué au soleil pendant 24 à 48 heures après l'application. En cas de nausée, étourdissement, mal de tête ou réaction allergique, cessez l'utilisation. Pour usage occasionnel uniquement. Pour une utilisation prolongée, veuillez consulter un médecin.