


※ 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시

제품명	이오 메가 리퀴드
용량	250mL
식품유형	건강기능식품/ EPA 및 DHA 함유 유지
소비기한	정확한 제품의 제조일자 및 유통기한을 확인하시려면 도테라코리아 소비자 상담실 ☎1600-5105으로 문의하여 주시기 바랍니다.
제조사 및 책임판매업자/제조국	제조원: Pharma Marine AS 책임판매업자: 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 제조국: 노르웨이
보관방법	직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하고, 개봉 시 냉장 보관하십시오. 냉동 또는 가열하지 마십시오. (오메가 3 특성상 공기와 온도에 민감하니, 뚜껑을 꼭 닫고 신선도를 유지해주세요.)
원재료 명 및 함량	정제어유혼합물[정제어유(대구, 고등어, 청어, 볼락), 로즈마리추출물, d-토코페롤(혼합형), 해바라기유, 레시틴, L-아스코빌팔메이트(산화방지제)], 올리브유, 레몬향(천연향료), 대두, 고등어 함유
[건강기능식품에 관한 법률]에 따른 유전자변형건강 기능식품 표시	해당 없음
영양정보 (1일 섭취량당 함량)	열량 83kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 9.2g(17%), 나트륨 0mg(0%), EPA와 DHA의 합 1,000mg ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임
기능정보	[EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지방 개선 · 혈행 개선 · 기억력 개선 · 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
섭취량, 섭취방법	1일 1회 10mL을 스푼에 덜어 섭취하십시오. (액상 그대로 드시거나, 쉐러드나 빵에 몇 방울 떨어뜨려 드셔도 좋습니다.)
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성	· 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압 강하제등)복용 시 전문가와 상담하십시오. · 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. · 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
의약품 여부	본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.
표시광고 사전심의필	
수입신고필	수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함
품질보증 기준	본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 품목별 소비자분쟁해결기준에 의해 보상해 드립니다.
소비자 안전을 위한 주의사항	이상사례 신고는 1577-2488
고객센터	1600-5105

제품명	피비 어시스트
식품유형	건강기능식품 / 프로바이오틱스 제품
제조사 및 책임판매업자/제조국	제조원: (주)서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 책임판매업자: 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 제조국: 한국
소비기한	정확한 제품의 제조일자 및 유통기한을 확인하시려면 도테라코리아 소비자 상담실 ☎1600-5105으로 문의하여 주시기 바랍니다.
용량	30포*2g (60g)
원료명	유산균혼합분말(락티카제이바실루스 람노서스 IDCC 3201, 락토코커스 락티스 IDCC 2301, 락티카제이바실루스 카세이 IDCC 3451, 락티플란티바실루스 플란타룸 IDCC 3501, 리질락토바실루스 살리바리우스 IDCC 3551, 비피도박테리움 락티스 IDCC 4301, 비피도박테리움 브레베 IDCC 4401, 난소화성말토덱스트린), 이눌린/치커리추출물, 자일리톨(감미료), 에리스리톨(감미료), 프락토올리고당, 메론향(천연향료), 딸기향(천연향료), 구연산, 대두, 우유 함유
영양정보 (1일 섭취량당 함량)	열량 10kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 5mg(0%), 프로바이오틱스 수 5,000,000,000CFU ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임
기능정보	[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
섭취량, 섭취방법	1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. 찬물, 주스 또는 좋아하는 찬 음료에 타서 바로 드십시오. 쉐러드나 스무디, 아침 시리얼 등에 섞어서 드셔도 좋습니다.
보관방법	직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오.
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성	질환이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
의약품 여부	본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.
표시광고 사전심의필	
수입신고필	수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함
품질보증 기준	본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 품목별 소비자분쟁해결기준에 의해 보상해 드립니다.
고객센터	1600-5105

제품명	브이엠비플러스
용량	282g(9.4g x 30포)
식품유형	건강기능식품/ 멀티 비타민 & 미네랄
소비기한	정확한 제품의 제조일자 및 유통기한을 확인하시려면 도테라코리아 소비자 상담실 ☎1600-5105으로 문의하여 주시기 바랍니다.
제조사 및 책임판매업자/제조국	제조원: 대만 / TCI(TAIWAN) PABP BRANCH 책임판매업자: 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 제조국: 미국
보관방법	직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오.
원료명	베타카로틴혼합제제[베타카로틴, 변성전분, d-토코페롤(혼합형)], 다시마추출물(다시마추출물,말토덱스트린), 비타민D3혼합제제[비타민 D3, 아라비아검,옥수수 시럽고형분, 가공유지(코코넛유), 이산화규소, L-아스코브산나트륨, d-토코페롤(혼합형)], 비타민B12혼합제제(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산나트륨, 구연산), 식물혼합물[아라비아검, 완두단백질, 보리순분말, 식물추출물(인디안구스베리열매추출물, 구아바 열매추출물,모링가잎추출물,레몬껍질추출물), 스피루리나분말, 식물발효액(프락토올리고당, 쌀식초,블루베리주스농축분말, 백포도주스농축분말, 크랜베리주스농축분말, 사과주스농축분말, 당근주스농축분말, 적포도주스농축분말, 소귀나무주스농축분말, 오디주스농축분말, 사탕수수주스농축분말, 패션프루트주스농축분말, 파인애플주스농축분말, 레몬주스농축분말, 브로콜리주스농축분말, 셀러리주스농축분말, 아스파라거스주스농축분말), 글리신, 해바라기레시틴, 말토덱스트린, 프랄스-해안검집질추출물, 사과추출물, 오렌지오일 · 라벤더오일 · 레몬그라스오일 · 페퍼민트오일 · 생강오일(천연향료), 포도씨추출물, 레몬발효추출물, 인디안구스베리추출물, 생강뿌리분말, 모링가잎추출물, 우엉분말, 울리브추출물, 라즈베리주스농축분말, 아로니아주스농축분말, 크랜베리주스농축분말, 사과주스농축분말, 딸기주스농축분말, 스위트체리주스농축분말, 블랙커런트주스농축분말, 포도과피색소, 엘더베리주스농축분말, 아세로라추출물, 석류추출물, 아사이추출분말, 케일추출분말, 블랙베리추출분말, 아티초크주스분말, 시금치주스분말, 양배추추출분말, 구연산] 아라비아검, 구연산, 향료제제(향료, 파인애플주스농축,망고추출물, 구아검,L-메티오닌, 스테비올배당체(감미료), 갈매보리수나무열매추출분말, 피로인산제이철혼합제제(피로인산제이철, 옥수수전분,레시틴), L-글루타민, 스트렙토코커스씨오필러스분말, 양배추추출분말,파인애플추출물, 파파야추출물, 키위분말, 락티카제이바실러스파라카세이, 락티플란티바실러스플란타룸 I, 락티플란티바실러스플란타룸 II, 락틸락토바실러스 사케이
영양정보 (1일 섭취량당 함량)	열량 25kcal, 탄수화물 5g(2%), 식이섬유 3.5g(14%), 단백질 2g(4%), 지방 0g(0%), 나트륨 5mg(0%), 베타카로틴 1.26mg, 오오드 105mg(70%), 비타민D 12.5μg(125%), 비타민B12 2.5μg(104%) ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임
기능정보	[베타카로틴] 1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 2) 뼈의 형성과 유지에 필요, 3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [오오드] 1) 갑상선 호르몬의 합성에 필요, 2) 에너지 생성에 필요, 3) 신경발달에 필요
섭취량, 섭취방법	1일 1회 1포를 섭취하십시오. 150~240ml의 찬물 또는 원하는 음료에 타서 드십시오. 거운 음료에는 타지 마십시오. 섭취 전 잘 저어주시거나 흔들어 주십시오.
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성	· 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하세요. · 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담하세요. · 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하세요.
의약품 여부	본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.
표시광고 사전심의필	
수입신고필	수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함
품질보증 기준	본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 품목별 소비자분쟁해결기준에 의해 보상해 드립니다.
고객센터	1600-5105